

Diviseurs et multiples.

I Division euclidienne.

Exercice 1.

Procédez à la division euclidienne de

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 356 par 5, | 6. 17 par 170, |
| 2. 827 par 30, | 7. 121 par 11, |
| 3. 232 par 7, | 8. 625 par 25, |
| 4. 1204 par 13, | 9. 97 par 7, |
| 5. 324 par 2. | 10. 244 par 3. |

II Diviseur et multiple.

Définition.

Déterminer des diviseurs simples d'un entier.

Exercice 2.

Déterminez les diviseurs parmi 2, 3, 4, 5, 6 et 10 des nombres suivants.

- | | |
|---------|----------|
| 1. 204, | 6. 189, |
| 2. 855, | 7. 332, |
| 3. 168, | 8. 84, |
| 4. 264, | 9. 306, |
| 5. 90, | 10. 165. |

Exercice 3.

Créez une fonction Python qui, à partir de deux entiers naturels a et n , renvoie la liste des n premiers multiples de a .

Exercice 4.

Créez une fonction Python qui, à partir de deux entiers a et b , vérifie si l'un est multiple de l'autre en renvoyant 0 (faux en informatique) ou 1 (vrai en informatique).

Déterminer tous les diviseurs (positifs) d'un entier.

Exercice 5.

Exercice 87 page 68 du manuel Indice 2019.

Exercice 6.

Exercices 86 et 88 page 68 du manuel Indice 2019.

Démontrer un résultat général avec multiple ou diviseur.

Exercice 7.

Démontrez que le produit d'un nombre pair par un entier naturel est un nombre pair.

Exercice 8.

Démontrez que la somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7.

Exercice 9. Application.

Démontrez que le produit d'un entier naturel divisible par 3 et d'un entier naturel divisible par 7 est divisible par 21.

Exercice 10. Application.

Démontrez que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.

Exercice 11.

Démontrez que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair.

Exercice 12.

Démontrez que le cube d'un nombre impair est un nombre impair.

Exercice 13.

Démontrez que l'ensemble des multiples de 6 est inclus dans l'ensemble des multiples de 3.

III Raisonnement par l'absurde.

Une invention grecque.

Démontrer par l'absurde que : $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Démontrer par l'absurde que : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Lemme 1

Soit $p \in \mathbb{Z}$.

Si p^2 est pair alors p est pair.

Exercices.

Exercice 14.

Sachant que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel, démontrez en raisonnant par l'absurde que :

1. $5\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
2. $3 + \sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
3. $\sqrt{\sqrt{2}}$ est un nombre irrationnel.

IV Exercices.

Exercice 15.

Une crèche dispose de 60 dalles carrées en mousse. Le personnel souhaite les placer de façon à former un rectangle.

1. Quelles sont les dimensions possibles de ce rectangle ?
2. Quel est celui qui a le plus grand périmètre ?

Exercice 16.

Lors d'un tournoi il y a 80 hommes et 60 femmes inscrits. L'organisation veut constituer un maximum d'équipes mixtes contenant toutes le même nombre d'hommes que de femmes. Combien d'équipes peuvent-elles être constituées ?

Exercice 17.

1. Quelles sont les valeurs possibles du reste de la division euclidienne d'un entier par 3 ?
2. Justifier que tout entier naturel a peut s'écrire, soit $a = 3q$, soit $a = 3q + 1$, soit $a = 3q + 2$, avec q un entier naturel.

Exercice 18.

Déterminez un nombre entier compris entre 600 et 800, qui est pair, divisible par 11 et multiple de 3 et de 5.

Exercice 19.

Montrez que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair.

Exercice 20.

Soient les nombres $a = 4p$ et $b = 5q$ avec p et q des entiers.

1. Justifiez que a est pair ?
2. b peut-il être pair ?
3. Soit $c = ab$. Montrer que c est un multiple de 10.

Exercice 21.

En utilisant la méthode du crible d'Ératosthène nous allons retrouver tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.

1. Écrivez la liste des entiers naturels de 2 jusqu'à 100.
2. Hormis 2 aucun multiple de 2 n'est un nombre premier. Entourez 2 et barrez ses autres multiples.
3. Hormis 3 aucun multiple de 3 n'est un nombre premier. Entourez 3 et barrez ses autres multiples.
4. 4 étant barré entourez 5. Hormis 5 aucun multiple de 5 n'est un nombre premier. Barrez les multiples 5 autres que 5.
5. Poursuivez ainsi jusqu'à ce que tous les nombres soient barrés ou entourés.
6. Donnez la liste des nombres premiers.

Exercice 22.

1. On a mesuré une durée de 92 647 secondes.
 - (a) Combien d'heures entières sont contenues dans 92 647 secondes ? Combien de secondes reste-t-il à exprimer en minutes et secondes ?
 - (b) Écrire 92 647 secondes en heures, minutes, secondes.
2. Écrire en Python un algorithme qui convertit un nombre n de secondes en heures, minutes et secondes.

Exercice 23.

Exercice 24.

Exercice 25.

1. Soit n un entier naturel non nul et $p = (n + 1)(n + 3)$. Montrez que p n'est pas premier.
2. Soit n un entier naturel supérieur ou égale à 2 et $q = (n - 1)(n^2 + 7)$. Pour quelles valeurs de n l'entier q est-il premier ?

Exercice 26.

Exercice 55 page 51 du manuel Déclic.

Exercice 27.

Discutez de la véracité des propositions suivantes.

1. Tout nombre entier strictement positif a un nombre pair de diviseurs.
2. Il y a plus de nombres premiers entre 20 et 30 qu'entre 40 et 50.
3. Un diviseur d'un nombre premier est forcément premier.
4. Si le carré d'un entier a est un diviseur de l'entier naturel n , alors a est un diviseur de \sqrt{n} .
5. Si l'entier a est un diviseur de l'entier b et s'il est aussi un diviseur de l'entier c , alors a^2 est un diviseur du produit bc .

Exercice 28.

Discutez de la véracité des propositions suivantes.

1. Si a est un diviseur n alors il existe un diviseur b de n tel que $ab = n$. Un entier a a donc toujours un nombre pair de diviseurs.
2. Puisque $25 = 3 \times 7 + 4$ le quotient de la division euclidienne de 25 par 3 est 7.
3. Si un entier naturel n est premier, alors $n + 1$ n'est pas premier.
4. Si un entier naturel n n'est pas premier, alors $n + 1$ est premier.
5. Le quotient de deux nombres rationnels non nul est un nombre rationnel.
6. La somme de deux nombre irrationnels est un nombre irrationnel.
7. Le produit de deux nombres irrationnels est un nombre irrationnel.
8. Le carré d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.


Exercice 29.

Un distributeur de billets délivre des billets de 10 €, 20 € et 50 €. Nous souhaitons le programmer pour qu'il délivre le moins de billets possible à chaque demande d'un utilisateur.

1. Un utilisateur veut retirer 720 €. Quels billets le distributeur devra-t-il délivrer ? Et s'il demande 460 € ?
2. Expliquez en langage naturel comment déterminer le nombre de billets de chaque type pour une demande d'un montant S en €, où S est un multiple de 10 non nul.

Exercice 30.

La figure ci-dessous est formée de trois carrés de côtés respectifs 3 cm, 4 cm et 5 cm.



Nous admettons que l'aire de la partie colorée est $\mathcal{A} = \frac{1}{2}(BP + CQ) \times BC$ (aire d'un trapèze).

Les résultats seront donnés sous forme irréductible.

1. À l'aide des triangles ACQ et ADF calculez CQ .
2. À l'aide des triangles ABP et ACQ calculez BP .
3. Calculez l'aire \mathcal{A} .

Exercice 31.

Un entier naturel de trois chiffres commence par 3 et se termine par 4. Le chiffre des dizaines est effacé : $3\dots 4$.

Peut-on trouver ce nombre si l'on sait qu'il est divisible par 9? 3? 4? 2? 5?

Exercice 32.

Nous allons démontrer en raisonnant par l'absurde que $\sqrt{3}$ est un nombre irrationnel. Nous supposons donc que $\sqrt{3}$ est un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'il s'écrit $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$, avec p et q des entiers naturels premiers entre eux et q non nuls.

1. Montrez que $p^2 = 3qq^2$.
2. Nous allons dans cette question démontrer que si 3 est un diviseur de p^2 alors il est aussi diviseur de p . Pour cela nous en raisonnerons à nouveau par l'absurde.
 - (a) Supposons que 3 n'est pas un diviseur de p . Montrez qu'alors le nombre p peut s'écrire, soit sous la forme $3k+1$ soit sous la forme $3k+2$, avec k entier.
 - (b) Si $p = 3k+1$ montrez que cela abouti à une contradiction.
 - (c) Faites de même si $p = 3k+2$.
 - (d) Concluez.
3. (a) Déduisez-en qu'il existe un entier naturel a tel que $q^2 = 3a^2$.
 - (b) En utilisant le résultat de la question 2. montrez qu'alors 3 est un diviseur de q .
 - (c) Concluez quand à l'irrationalité de $\sqrt{3}$.

Exercice 33.

Un entier est appelé un carré parfait s'il est le carré d'un autre entier. Démontrez l'équivalence suivante pour tout entier naturel n : « \sqrt{n} est un entier si et seulement si n est un carré parfait ».

Exercice 34.

À la fin du trimestre le professeur fait des moyennes. Ses élèves avaient 12 notes. Les moyennes sont inscrites sur le cahier de notes arrondies au $\frac{1}{2}$ point supérieur. le professeur ne veut pas faire de divisions (surtout s'il a beaucoup d'élèves) et il n'a pas de machine : il se fabrique alors une table de multiplication par 12

1	12
2	24
3	36
...	...


Complète cette table.

Dis comment le professeur peut faire pour trouver alors les moyennes de :

- France qui a 193 points,
- Georges qui a 157 points,
- Laurence qui a 106 points,
- Lucien qui a 52 points.

Exercice 35.

12. Voici un organigramme.
Après l'avoir lu et compris, fais-le fonctionner comme dans l'exemple donné sous l'organigramme (avec deux nombres de ton choix).
Quelle opération penses-tu avoir réalisée à partir des deux nombres choisis ?



1	28	8	20
2	20	12	
3	12	4	

Exercice 36.

Une voiture est filmée lors d'une prise de vue cinématographique. Elle est équipée de roues à **cinq rayons** ayant un diamètre total de 54 cm. L'une de ces roues est représentée ci-dessous :

1. Calculer la circonférence de cette roue en cm (arrondie au millimètre).
2. La voiture roule à 110 km.h^{-1} .
 - (a) Calculer le nombre de tours par seconde que fait la roue (au tour près).
 - (b) La caméra utilisée a une vitesse de défilement de 24 images par seconde. Combien de tours aura fait le pneu de la voiture entre deux images ?
3. À quelle vitesse, en km/h, devrait rouler la voiture pour que, regardant le film, on ait l'impression que les roues ne tournent pas ?

Exercice 37.

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant.

1. Affirmation : « 117 est un nombre premier. »
2. Affirmation : « Pour n'importe quel nombre entier n , $(n + 2)^2 - (n - 2)^2$ est un multiple de 8. »

Exercice 38.

Démontrez que $\frac{1}{3}n$ n'est pas un nombre décimal en raisonnant par l'absurde.

Indication. Dire qu'une nombre est décimal cela signifie que nous pouvons l'écrire $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 39.

Démontrez que l'ensemble des nombres premiers est infini en raisonnant par l'absurde.

Indication. Considérez le produit de tous les nombres premiers augmenté de 1.

Exercice 40.

Écriture décimale périodique et rationalité.

1. Écriture décimale.

Le nombre $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ n'est pas un nombre décimal mais on peut écrire son développement décimal illimité sous la forme $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$.

- Posez la division euclidienne de 14 par 11 et de 1427 par 333.
- Qu'observez-vous ?
- Écrivez le développement décimal illimité de chacun des quotients $\frac{14}{11}$ et $\frac{1427}{333}$.
- Quelles valeurs peuvent prendre les restes dans une division par 11 ?
Comment alors pouvez-vous expliquer cette périodicité dans la partie décimale de $\frac{14}{11}$?
 - Quelles valeurs peuvent prendre les restes dans une division par 333 ?
Comment alors pouvez-vous expliquer cette périodicité dans la partie décimale de $\frac{1427}{333}$?
 - De manière plus générale, que pouvez-vous dire du développement décimal d'un nombre rationnel ?

2. Nous savons à partir de l'écriture fractionnaire d'un nombre rationnel déterminer son développement décimal. Dans cette partie, nous chercherons sur des exemples, une écriture fractionnaire d'un nombre rationnel écrit sous la forme d'un développement décimal périodique.

- Considérons le nombre $x = 1,\overline{8}$.
Calculez $10x - x$ et concluez.
- Adaptez la méthode afin de déterminer une écriture fractionnaire de $y = 1,\overline{58}$ puis de $z = 4,23\overline{569}$.
- Montrez que $0,\overline{9} = 1$.
Le résultat de cette question est surprenant : le développement décimal illimité de certains nombres n'est pas forcément unique.

Exercice 41.

Algorithme d'Euclide pour déterminer le P.G.C.D. de deux entiers naturels.

Exercice 42.

Écriture décimale et divisibilité

Exercice 43.

Polynôme d'Euler.